

# แนวทางการให้ยาได้ผิวหนังของผู้ป่วย Palliative care กลับบ้าน โรงพยาบาลสิรินธร

ผู้ป่วยระยะท้ายที่เข้าสู่ระยะ Dying และต้องการ  
ต้องการกลับไปเสียชีวิตที่บ้าน

ทีมดูแลระดับประคองเตรียมความพร้อมก่อนกลับบ้าน

## แพทย์

- จัดการอาการที่ไม่สุขสบาย
- Anticipatory symptoms
- สั่งยาฉีดกลับบ้านพร้อมใบ  
ใบยส.
- ออกใบรับรองแพทย์

## พยาบาล

- ทำ discharge plan
- สอนการบริหารยาที่บ้าน
- สอนวิธีการใช้อุปกรณ์
- ส่งต่อข้อมูลให้กับสถานพยาบาล  
ปลายทาง
- ให้ข้อมูลการปฏิบัติตัวหลังผู้ป่วย  
เสียชีวิต

## เภสัชกร

- จัดหายาให้เพียงพอ  
ไปใช้ที่บ้าน
- ตรวจสอบความถูกต้อง  
ของยา
- สถานที่เก็บยา opioid

## พิเศษ 6/1/ ศูนย์ชีวประติป

- สถานที่สำหรับผสมยาในแต่ละ  
ครั้ง (ในเวลาทำที่พิเศษ 6/1,  
นอกเวลาทำที่พิเศษ 6/1)
- สถานที่เก็บอุปกรณ์ให้ยาได้  
ผิวหนัง
- บันทึกแบบฟอร์มส่งต่อการให้ยา  
ทาง SC

เมื่อผู้ป่วยมาต่อยา ทีมดูแลระดับประคองจะขอเบิกยา  
ดังกล่าวจากเภสัชกรมาผสมยาให้ผู้ป่วย

ส่งข้อมูลให้ เวช/ศูนย์บริการสาธารณสุข  
เพื่อเยี่ยมบ้านต่อไป

ญาติมารับยาที่ผสมพร้อมใบสั่งยาที่ พิเศษ 6/1

ผู้ป่วยเสียชีวิต

พยาบาล PCN เก็บยาคืน ศูนย์บริการสาธารณสุข  
ลงเยี่ยมบ้านเพื่อเก็บหัวเข็ม และอุปกรณ์ให้ยา ที่ฉุงแดง

- ยาฉีดที่เหลือจะนำยาเข้า stock ยาบริจาด
- เมื่อมีผู้ป่วยรายใหม่ สามารถนำยาบริจาดข้างต้นมา  
ใช้ได้ โดยคีย์ว่ามีการใช้จริง แต่ลงจำนวนเป็น 0
- ทีมจะสื่อสารกับทางห้องยาว่าใช้ยาบริจาด