

โรงพยาบาลสิรินธร
สำนักงานแพทย์ กรุงเทพมหานคร



วิธีปฏิบัติงาน
(WORK INSTRUCTION)

เรื่อง

การให้ยาทางปาก

หมายเลขเอกสาร WI-NUR๐๑-GEN๐๓๒:Rev.๐๐ จำนวนหน้าทั้งหมด ๒ หน้า

รายนาม	ตำแหน่ง	ลงนาม	วันที่
ผู้จัดทำ/ผู้รับผิดชอบ	ผู้ปฏิบัติงาน		๑๖ ธ.ค. ๒๕๖๕
ผู้ทบทวน	หัวหน้างาน		๑๖ ธ.ค. ๒๕๖๕
ผู้อนุมัติ	หัวหน้างาน/ฝ่าย/กลุ่มงาน		๑๖ ธ.ค. ๒๕๖๕

วิธีปฏิบัติการฉบับนี้ เป็นกรรมสิทธิ์ของโรงพยาบาลสิรินธร

ประวัติการแก้ไข			
แก้ไขครั้งที่	วันที่บังคับใช้	ผู้ขอแก้ไข	รายละเอียดการแก้ไข

	โรงพยาบาลสิรินธร สำนักงานแพทย์ กรุงเทพมหานคร SIRINDHORN HOSPITAL BANGKOK METROPOLITAN		หมายเลขเอกสาร WI-NUR๐๑-GEN๐๓๒
	วิธีปฏิบัติงาน WORK INSTRUCTION	ฉบับแก้ไขครั้งที่: ๐๐ วันที่บังคับใช้: ๒๐/๑๒/๖๕	หน้า ๑/๒
เรื่อง การให้ยาทางปาก			

๑. วัตถุประสงค์

- ๑.๑. เพื่อให้ผู้ป่วยทุกคนได้รับการให้ยาชนิดรับประทานตามแผนการรักษาและถูกต้องตามหลักการให้ยา (๖R)
- ๑.๒. เพื่อให้ผู้ป่วยไม่เกิดอันตรายและภาวะแทรกซ้อนจากการได้รับยาชนิดรับประทาน

๒. ขอบเขต

ใช้ในการเป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับการให้การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการให้ยาทางปาก

๓. ผู้ปฏิบัติ, ผู้รับผิดชอบ, วัตถุประสงค์

พยาบาลวิชาชีพ/ พยาบาลเทคนิค

๔. ขั้นตอนวิธีปฏิบัติและรายละเอียด

๔.๑. เมื่อแพทย์สั่งยาในใบคำสั่งการรักษาตามลายลักษณ์อักษร (ในกรณีที่เป็นคำสั่งการรักษาทางโทรศัพท์ วาจาหรือ Application Line ให้พยาบาลผู้รับคำสั่งการรักษา บันทึกยาตามคำสั่งการรักษาในใบคำสั่งการรักษาทุกครั้งโดยลง วันที่ เวลาที่รับคำสั่งการรักษาจากแพทย์ พยาบาลหัวหน้าเวร ดำเนินการให้แพทย์ลงนามใน ๒๔ ชั่วโมงทำการ) ลงบันทึกในใบบันทึกการให้ยาชนิดรับประทาน แยกเป็นคำสั่ง one day และ Continue ด้วยปากกาน้ำเงิน โดยตรวจสอบความถูกต้อง ของคำสั่งการรักษาในใบบันทึกการให้ยา กรณีใช้ Kardex บันทึกลง Kardex ตรวจสอบการบันทึก ตรวจสอบความถูกต้องในเวรป่วยและตรวจสอบการบันทึกยาทั้งหมดทุกเวรคืน

๔.๒. พยาบาลผู้รับผิดชอบในการให้ยาชนิดรับประทานตรวจสอบความถูกต้องตาม ชื่อ-นามสกุลผู้ป่วย ชื่อยา ขนาดยาและเวลาที่ให้ยาเพื่อเตรียมจัด แจกยาให้แก่ผู้ป่วยตามเวลา

๔.๓. พยาบาลผู้จัดยาล้างมือตามหลักมาตรฐานการล้างมือก่อนทำการ จัด-แจกยาผู้ป่วย

๔.๔. ตรวจสอบชื่อ-สกุล ในใบบันทึกการให้ยา แล้วหยิบยาที่มีชื่อเดียวกันออกมาจากกล่องยาผู้ป่วยหรือตู้เย็น

๔.๔.๑. การเตรียมยาเม็ด ใช้ช้อนตักยาออกจากขวดหรือซองยา ตามจำนวนที่ต้องการก่อน แล้วจึงใส่ถ้วยยา

๔.๔.๒. การเตรียมน้ำ ให้เขย่าขวดก่อนเปิดฝาและหมุนฉลากยาข้างขวดไว้ด้านบนหรือในอุ้งมือให้ผู้จัดยาสามารถมองเห็นได้ชัดเจน ขณะรินยาให้ยกแก้วสูงระดับสายตา

๔.๔.๓. การเตรียมน้ำสำหรับเด็กหรือที่จำเป็นต้องใช้ Syringe ดูดยา ให้หันฉลากยาเข้าหาตัวผู้จัดและใช้ Syringe ดูดยาน้ำหรือใช้ช้อนตวงปาดตามจำนวนที่ต้องการ

๔.๔.๔. การเตรียมยาชนิดผง เทยาลงในแก้วแล้วเติมน้ำสะอาดและใช้ช้อนคนให้เข้ากัน

๔.๕. ภายหลังเตรียมยาเสร็จ จัดเก็บซองยาหรือขวดยาเข้ากล่องยาผู้ป่วยแต่ละคนให้ถูกต้อง

๔.๖. เข็นรถแจกยาไปที่เตียงหรือหน้าห้องผู้ป่วยพร้อมกับการนำใบบันทึกการให้ยาของผู้ป่วยแต่ละเตียงหรือห้องไปด้วย

๔.๗. ตรวจสอบชื่อ-สกุลผู้ป่วย ขนาด ชนิด จำนวนเม็ดยาและปริมาณยาที่จัดเตรียมไว้ของผู้ป่วยแต่ละเตียงหรือห้องให้ตรงกับใบบันทึกการให้ยา โดยพยาบาลวิชาชีพ ๒ คน ก่อนแจกยาทุกครั้ง (กรณีผู้ป่วยรับยารับประทานครั้งแรก ให้ผู้แจกยาสอบถามข้อมูลการแพ้กับผู้ป่วยหรือญาติด้วย)

๔.๘. อธิบายให้ผู้ป่วยทราบวัตถุประสงค์ที่ให้ยา ฤทธิ์ยา ภาวะแทรกซ้อนและอาการข้างเคียงของยาที่อาจเกิดขึ้น

๔.๙. ประเมินอาการก่อนให้ยาบางชนิด เช่น นับชีพจร วัดความดันโลหิต ก่อนให้ยา เป็นต้น

๔.๑๐. ช่วยพยุงผู้ป่วยให้ลุกนั่งบนเตียง ถ้าลุกนั่งไม่ได้จัดให้ผู้ป่วยนอนศีรษะสูงเพื่อป้องกันการสำลักขณะกลืนยา

๔.๑๑. ให้ผู้ป่วยรับประทานยาต่อหน้าจนหมดไม่ทิ้งยาไว้ข้างเตียง

๔.๑๒. บันทึกการให้ยาแบบ Real time ทั้งชื่อผู้ให้ยา ผู้ตรวจสอบและเวลาที่ให้ในใบบันทึกการให้ยา

	โรงพยาบาลสิรินธร สำนักงานแพทย์ กรุงเทพมหานคร SIRINDHORN HOSPITAL BANGKOK METROPOLITAN		หมายเลขเอกสาร WI-NUR๐๑-GEN๐๓๒
	วิธีปฏิบัติงาน WORK INSTRUCTION	ฉบับแก้ไขครั้งที่: ๐๐ วันที่บังคับใช้: ๒๐/๑๒/๖๕	หน้า ๒/๒
เรื่อง การให้ยาทางปาก			

- ๔.๑๓ ล้างมือตามหลักมาตรฐานการล้างมือ หลังจัด-แจกยาให้ผู้ป่วย
- ๔.๑๔ ประเมินผลผู้ป่วยภายหลังให้ยาแล้ว ๓๐ นาที เพื่อประเมินอาการและอาการไม่พึงประสงค์
ภาวะแทรกซ้อนและผลข้างเคียงที่เกิดหลังการได้รับยา
- ๔.๑๕ บันทึกการพยาบาลทุกครั้งหลังให้ยาผู้ป่วย
- ๕. เกณฑ์การชี้วัด**
 - ๕.๑ อัตราความคลาดเคลื่อนทางยา จากการให้ยารับประทานตามหลัก ๖R
 - ๕.๑.๑ ก่อนการให้ยา Pre-Administration Error < ๑๐ ครั้ง/๑,๐๐๐ วันนอน
 - ๕.๑.๒ หลังการให้ยา Post-Administration Error < ๕ ครั้ง/๑,๐๐๐ วันนอน
 - ๕.๒ อัตราการเกิดอันตรายและภาวะแทรกซ้อนจากการให้ยา = ๐